

## Métodos de Controlo

Não existe ainda nenhum método de controlo eficaz para eliminar a *Vespa velutina*, sendo que a instalação descontrolada de armadilhas e a destruição dos ninhos de outras espécies de vespas é prejudicial para a biodiversidade, principalmente de insetos polinizadores.

Pelos efeitos colaterais provocados por capturas massivas e descontroladas, recomenda-se o uso de armadilhas caso haja forte predação em apiários.

Nenhuma das armadilhas atualmente utilizadas é seletiva para a *Vespa velutina*.

A destruição dos ninhos da *Vespa velutina* é considerado o melhor método de limitar localmente o impacto das mesmas sobre abelhas, outros insetos e eventualmente pessoas.

Para mais informação deverá ser consultado o  
“Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da *Vespa velutina* em Portugal”,  
disponível no portal  
[www.icnf.pt](http://www.icnf.pt)

## Notificação de suspeitas

- ⇒ Preenchimento online de formulário disponível em [www.sosvespa.pt](http://www.sosvespa.pt) — **ANEXAR FOTOS**
- ⇒ Comunicação via smartphone ([www.sosvespa.pt](http://www.sosvespa.pt))
- ⇒ Linha SOS Ambiente **808 200 520**
- ⇒ Juntas de Freguesia

## Destruição de ninhos de *Vespa velutina*

De acordo com as orientações do

“Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da *Vespa velutina* em Portugal”, disponível no portal  
[www.icnf.pt](http://www.icnf.pt)



Não usar armas de fogo  
Não destruir parcialmente o ninho

Porque dissemina as vespas  
que constituem assim novos ninhos



# *Vespa velutina* ou vespa asiática

## A *Vespa velutina*

A *Vespa velutina*, ou vespa asiática, é uma vespa de grandes dimensões : rainhas: corpo +/- 3 cm, obreiras: corpo +/- 2,5 cm). A cabeça é preta com face laranja/ amarelada.

O corpo é castanho-escuro ou preto aveludado, delimitado por uma faixa fina amarela e um **único segmento abdominal** quase inteiramente amarelado-alaranjado.


Os ninhos primários têm cerca de 5-10 cm de diâmetro. Os ninhos secundários têm uma forma redonda ou em pera, com cerca de 50-80 cm de diâmetro, e são geralmente feitos em árvores altas em áreas urbanas e rurais.



Ninhos primários



Ninhos secundários



## Identificar a *Vespa velutina*

Diferença mais significativa entre a

*Vespa velutina* (asiática) e a *Vespa crabro* (europeia):

**Coloração do abdômen**



*Vespa velutina* ou asiática



*Vespa crabro* ou europeia

## A *Vespa velutina*

A *Vespa velutina* é essencialmente um predador de outras vespas e de abelhas, mas, tal como a vespa europeia, também se alimenta de uma grande variedade de outros insetos.

A *Vespa velutina* não é fonte de transmissão de nenhuma doença das abelhas.

A *Vespa velutina* não é considerada mais perigosa para seres humanos do que a vespa europeia.



D. Jourdain

# O que fazer relativamente à vespa asiática

(*Vespa velutina nigrithorax*)



A deteção ou a suspeita de existência de ninho ou de exemplares de vespa asiática deverá ser comunicada através de um dos seguintes meios:

- preenchimento online do formulário disponível no portal [www.sosvespa.pt](http://www.sosvespa.pt) (Anexo IV do Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da *Vespa velutina* em Portugal), acessível a partir dos portais da DGAV, do INIAV, do ICNF, das DRAP, do SEPNA/GNR e da Câmara Municipal;
- contactar a linha **SOS AMBIENTE (808 200 520)**; neste caso será informado do procedimento a seguir para a efetiva comunicação da suspeita;
- poderá também solicitar a colaboração da sua junta de freguesia para o preenchimento do formulário - Anexo IV